

ABSTRAK

HIV/AIDS adalah penyakit menular yang disebabkan virus HIV, yang menyerang sel CD4 atau sel T, sehingga melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Yogyakarta menduduki peringkat ke-9 dari seluruh provinsi di Indonesia untuk jumlah kumulatif penderita HIV dan AIDS pada periode 2001-2017. Kepatuhan pengobatan pasien HIV/AIDS dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dukungan sosial dan efek samping obat, efek samping obat yang mengganggu dapat menurunkan kepatuhan dan adanya dukungan sosial dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dan efek samping obat terhadap kepatuhan pengobatan ODHA di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan desain *cross sectional* dengan *purposive sampling*, data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan *uji Somers'D* untuk menilai hubungan dukungan sosial dan efek samping obat terhadap kepatuhan pengobatan pasien HIV/AIDS di RS Panti Rapih Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47 responden mendapat dukungan sosial baik dan 23 responden mendapat dukungan cukup, sebanyak 27 pasien mengalami efek samping ringan dan 4 pasien mengalami efek samping berat, dan 49 pasien patuh dalam pengobatan. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan dukungan sosial terhadap kepatuhan pengobatan pasien HIV/AIDS rawat jalan di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta ($p = 0,009$) dengan kekuatan korelasi sedang ($r = 0,473$). Ada hubungan efek samping terhadap kepatuhan pengobatan pasien HIV/AIDS rawat jalan di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta ($p = 0,043$) dengan arah korelasi negatif dan kekuatan korelasi lemah ($r = -0,337$).

Kata Kunci: HIV/AIDS, kepatuhan pengobatan, dukungan sosial, efek samping obat, Rumah Sakit.

ABSTRACT

HIV/AIDS is an infectious disease caused by the HIV virus, which attacks CD4 cells or T cells, thus weakening the human immune system. Yogyakarta ranked 9th out of all provinces in Indonesia for the cumulative number of HIV and AIDS patients in the period 2001-2017. Treatment adherence of HIV/AIDS patients can be influenced by several factors such as social support and drug side effects, disturbing drug side effects can reduce adherence and the presence of social support can increase treatment adherence. This study was conducted to determine the relationship between social support and drug side effects on treatment adherence of PLWHA at Panti Rapih Hospital Yogyakarta. This study used a cross sectional design with purposive sampling, data were collected through questionnaires and analyzed with Somers'D test to assess the relationship between social support and drug side effects on treatment adherence of HIV/AIDS patients at Panti Rapih Hospital Yogyakarta. The results showed that 47 respondents received good social support and 23 respondents received sufficient support, 27 patients experienced mild side effects and 4 patients experienced severe side effects, and 49 patients were compliant in treatment. The results of the analysis showed that there was a relationship between social support and treatment adherence of outpatient HIV/AIDS patients at Panti Rapih Yogyakarta Hospital ($p = 0.009$) with moderate correlation strength ($r = 0.473$). There is a relationship between side effects and treatment adherence of outpatient HIV/AIDS patients at Panti Rapih Yogyakarta Hospital ($p = 0.043$) with negative correlation direction and weak correlation strength ($r = -0.337$).

Keywords : HIV/AIDS, medication adherence, social support, drug side effects, Hospital

